

Test respiratoire à visée digestive

INTRODUCTION

La prescription d'un Test respiratoire est proposée afin d'observer l'activité bactérienne de votre tube digestif. Ce test facile à réaliser donne des résultats précis et fiables sur les intolérances aux sucres et aux polyols, les hypersensibilités et les pullulations bactériennes.

PRINCIPE DE L'EXAMEN :

Il s'agit de récupérer votre air expiré provenant de vos poumons en soufflant dans un sachet ou un tube afin d'analyser les gaz présents dans votre air expiré et qui ont été produits par votre activité digestive afin de voir si celle-ci ne fonctionne pas correctement ou si une quantité trop importante de bactéries naturelles est présente dans votre tube digestif.

DEROULEMENT :

Vous boirez un verre d'eau contenant un **sucré dissous** ou une solution buvable déjà prête :

- Lactose (durée moyenne 3h30-4h30) :
 - afin de chercher une mauvaise digestion du sucre du lait par l'existence d'un déficit enzymatique en lactase ou [intolérance ou malabsorption du lactose](#)
- Fructose (durée moyenne 3h30-4h30) :
 - afin de chercher une mauvaise digestion du fructose, sucre principal des fruits et préparations culinaires à base de fruits ou [intolérance / malabsorption du fructose](#)
- Sorbitol, Maltitol ou Xylitol (durée moyenne 3h30-4h30) :
 - afin de tester votre sensibilité aux polyols ou [intolérance/ malabsorption aux polyols](#). Les polyols sont contenus dans certains aliments, préparations culinaires, boissons et sucreries dites « sans sucres ». Le Sorbitol est également fabriqué naturellement dans le pruneau

INCONVENIENTS POSSIBLES MINEURS : gêne, ballonnements, petite diarrhée

PREPARATION 4 SEMAINES AVANT L'EXAMEN :

-Arrêter tout traitement Antibiotique ou au Bismuth en accord avec votre médecin. Excepté s'il s'agit du contrôle d'efficacité du traitement de la pullulation (l'antibiotique sera arrêté seulement 24h avant le test)

- Ne pas réaliser d'Endoscopie digestive jusqu'au rendez vous
- Arrêter toute cure de Probiotiques (Lactobacillus, Bifidus, Kéfir, Autres ...)
- Ne pas réaliser l'examen si persistance de fortes diarrhées

48H AVANT L'EXAMEN

-Arrêter tout traitement pour la motricité digestive (MOTILIUM, PRIMPERAN, ...).

- Arrêter toute prise d'IPP (OMEPRAZOLE, PANTOPRAZOLE, INEXIUM®)

24H AVANT L'EXAMEN

-Arrêter tout traitement laxatif (DUPHALAC...)

-Arrêter tout traitement anti diarrhéique (IMODIUM...)

LES ALIMENTS AUTORISES LA VEILLE :

- Les boissons : eau, café, thé sans sucre et tisanes nature sans fruits, ne pas sucrer avec le miel.
- Sont autorisés les laitages sans lactose / sans fructose / sans glucose
- Les aliments : Poisson, Œufs, Viande, Riz blanc, Pommes de terre
- En cas « d'habitude forte », un petit morceau de pain blanc est accepté

LES ALIMENTS A NE PAS MANGER LA VEILLE :

- Pain de tout type de farine / Biscottes
- Pâtes complètes / Pâtes blanches
- Céréales en grains ou en flocons (avoine, blé, sarrasin, millet, quinoa, amarante, etc. ...).
- Noix / Noisettes / Amandes et autres
- Graines et graines germées en ingrédient direct ou mélangés dans une préparation.
- Légumes : en frais, cuits ou en soupe...
- Légumineuses : haricots, pois, lentilles...
- Fruits : frais, secs, en compote, en conserve...
- Produits laitiers : lait, fromages, yaourt, crème, beurre ...
- Boissons : Toutes boissons sucrées, sodas, aux fruits, dites « sans sucres »
- Boissons alcoolisées.
- Dessert et bonbons : crème glacée, gâteaux, chewing-gum, bonbons ...

LA VEILLE :

Petit déjeuner : Léger

Déjeuner : Léger

Dîner : Il est important de ne pas le prendre trop tard (19h- 19h30) pour laisser votre intestin le temps de digérer avant le coucher. **NB** : votre dernière cigarette avant 20h.

Aliments autorisés : eau, café, thé, tisane simple et le tout sans sucre.

Boissons autorisées : poisson, viande blanche bien machée pour une digestion plus simple, œuf.

La nuit : Restez à jeun (ne pas manger, ni boire tout type de boisson), sauf de l'eau pour ne pas se déshydrater.

Le matin au lever :

- Se lever 1 à 2 heures avant le test, boire 1 ou maximum 2 verres d'eau non gazeuse le matin au lever.
- Rester à jeun (pas de chewing-gum)
- Se brosser les dents (dentifrice ou produit de prothèse dentaire NON MENTHOLE)
- Effectuer un rinçage buccal d'au moins 30 secondes au Bain de Bouche Antibactérien.
- Prendre vos médicaments (vasculaires et autres) sauf ceux arrêtés comme indiqués au début.
- Ne pas prendre de vitamines
- Ne pas fumer
- Ne pas faire d'effort physique
- N'utilisez pas de parfum (action de la vapeur d'alcool)

+Note : Si vous êtes diabétique, ne **pas prendre l'insuline** du matin car vous êtes à jeun ! Contacter votre médecin pour savoir si vous devez prendre une demi-dose et prévenez l'opérateur du test. Prenez avec vous votre glucomètre.

DEROULEMENT DU TEST

A jeun, sans fumer, sans stress (pas de jeux sur téléphone), calme, lecture

Vous soufflerez une première fois puis vous boirez un verre d'eau avec le sucre dissous puis plusieurs fois à intervalles réguliers (10 min – 15 min – 20 min ou 30 minutes) selon le protocole choisi pendant 2h à 4h environ.

Note : indiquez ce que vous ressentez (malaise, ballonnement, douleur, tension abdominale, besoin d'aller aux toilettes...)

Note : si vous avez soif, vous pourrez boire un verre d'eau non gazeuse au bout de 1h à 1h 30 de test.

APRES L'EXAMEN : Il n'y a pas de nécessité de surveillance particulière.